



## "برخی از تداخل های مهم دارویی"



داروی ۱	داروی ۲	عارضه
Warfarin	NSAIDs	افزایش ریسک خونریزی گوارشی
Warfarin	Co-trimoxazole, Ciprofloxacin, Ofloxacin, Erythromycin, Clarithromycin	احتمال خونریزی از لثه و بینی و مشاهده خون در ادرار، مدفوع و خلط گلو
Warfarin	Phenytoin	افزایش عوارض وارفارین به صورت خون ریزی و عوارض فنی توئین به شکل عدم تعادل، دوبینی و اختلال گفتاری
Captopril, Enalapril	Spirolactone, Triamterene	افزایش پتاسیم خون که با عوارضی چون سوزش دست و پا، ضعف عضلانی و در حالت شدید با ایست قلبی همراه است
Theophylline	Ciprofloxacin, Ofloxacin	باعث مسمومیت با تئوفیلین می شود که علائم آن عبارت است از: تهوع، استفراغ و تشنج
Atorvastatin, Simvastatin, Lovastatin, Rosuvastatin	Erythromycin, Clarithromycin	افزایش غلظت استاتین ها: با عوارضی چون آسیب کبدی (زردی پوست و چشم)، تخریب بافت عضلانی و نهایتا آسیب کلیوی (درد عضلانی، راش پوستی، تب و تیرگی ادرار) و حتی مرگ
Digoxin	Amiodarone, Verapamil	کاهش شدید ضربان قلب
Sildenafil	Isosorbide	کاهش شدید فشار خون
Propranolol	Clonidine	افزایش شدید فشار خون
Bromocriptine	Pseudoephedrine	افزایش شدید ضربان قلب، تشنج و حتی مرگ