



کوکائین

👉 کوکائین از محرک های سیستم اعصاب مرکزی (افزایش دوپامین) بوده و یکی از اعتیاد آورترین و خطرناکترین موادی است که مورد سوء مصرف قرار می گیرد.

👉 این ماده از برگ گیاه کوکا که عمدتاً در آمریکای مرکزی و جنوبی می روید به دست می آید.
👉 **نامهای رایج :**

snow ، برف ، coke ، کراک ، راک

👉 **اشکال موجود :**

پودر سفید رنگ ، خمیره ی کوکائین (Coca paste)، معمولاً موادی نظیر بی حس کننده های موضعی (لیدوکائین ، پروکائین یا تتراکائین) یا گلوکز به ان اضافه می شود.

👉 **نحوه مصرف:**

اصلی ترین راه مصرف استنشاق می باشد ، امکان تزریق زیرجلدی و داخل وریدی هم وجود دارد.

اثرات مصرف

✍ کوکائین به شدت اعتیاد جسمی و روانی ایجاد می کند .

✍ وابستگی روانی به کوکائین ممکن است حتی پس از یک بار مصرف به وجود آید .


✍ اثرات کوکائین بلافاصله بعد مصرف ظاهر شده و ۳۰ تا ۶۰ دقیقه بعد رفع می شود. به همین علت افراد وابسته به کوکائین ممکن است هر نیم تا یک ساعت یک بار برای مصرف مجدد از جمع یا محل کار خارج شوند.

عوارض جسمانی: افزایش فشارخون و ضربان قلب، گشاد شدن مردمک، کاهش اشتها، کاهش وزن، اختلالات گوارشی، نارسایی قلبی، کاهش نیروی جنسی، پرکاری غده تیروئید، آسیب شدید مخاط بینی به حدی که جدار بین دو بینی کامل از بین می رود، تشنج های، نارسایی تنفسی، کوما، مرگ.


عوارض روانی: افزایش اعتماد به نفس، سرخوشی، افزایش انرژی، احساس خوب بودن عمومی، اختلال در خواب، پارانویا (هذیان گویی)، توهمات لامسه به صورت احساس خزیدن حشرات زیر پوست، کاهش تمرکز.

در اکثر موارد به دنبال ایجاد پارانویا و توهم فرد به انواع رفتارهای تهاجمی و خشونت بار دست می زند که این گونه رفتارها می تواند عامل بسیاری از جنایات و جرم های معتادان به کوکائین باشد.

Normal Communication



Communication When Cocaine Is Present



← مسمومیت:

در مصرف مقادیر فوق العاده زیاد کوکائین مسمومیت و مرگ
روی می دهد که تابلوی مرگ به صورت تشنج، افزایش شدید
فشار خون و نارسائی قلبی است.

کوکائین ۸ تا ۶ ساعت پس از مصرف در ادرار قابل تشخیص است.

درمان

☞ قطع کردن تدریجی هیچ فایده ای ندارد و قطع کردن سریع به مراتب بهتر است.

☞ علائم ترک کوکائین معمولا یک روز تا یک هفته طول می کشد.

☞ **علائم ترک شامل :**

افسردگی (درمان دارویی)، خواب آلودگی، خستگی (یک هفته) ، تحریک پذیری و گرسنگی.

چنانچه مصرف کوکائین جدی نباشد میشود بدون نیاز به دارو و جایگزین های مربوطه ترک را انجام داد. باید به مقدار زیادی مایعات (به غیر از الکل) و سه وعده غذای روزانه در رژیم غذایی گنجانده شود. ورزشهای آرام بخش کمک کننده اند .

منابع

این مجموعه بیشترین مطالب خود را از این سایت ها گرفته است.

- <http://www.drugabuse.org.gov>
- <http://www.nid.nih.gov>
- <http://www.usdog.gov>
- <http://www.erowid.org>



آیامی توان تصور نمود که
مواد مخدر در مدت کوتاهی

'کاخچی' را به 'گوخچی' تبدیل نماید .