



ICE



کریستال

↪ نام های رایج :

glass, crystal, ice , crank , meta , Speed

↪ اشکال موجود :


پودر کریستالی با حلالیت بالا در آب یا الکل ، دانه های بلور، سیگار ، قرص

↪ نحوه مصرف :


خوراکی ، تزریقی ، استنشاقی .

اثر مت آمفتامین بر مغز

- ⇐ مت آمفتامین بعلت حلالیت بالا در چربی به راحتی از سد خونی مغز عبور کرده و با تاثیر بر پایانه های عصبی باعث آزاد شدن میانجی های عصبی می شود.
- ⇐ مت آمفتامین مانع جذب مجدد میانجی های عصبی به داخل نورون ها می گردد.
- ⇐ در دوزهای بالاتر مت آمفتامین بعنوان یک مهار کننده منو آمینو اکسیداز عمل می نماید.
- ⇐ ترشح میانجی های عصبی از یک طرف و عدم باز جذب آنها از سویی دیگر باعث تخریب نورونها و تحلیل بافت مغز شده که این ضایعه برگشت ناپذیر خواهد بود.



- ◀ Methamphetamine
- Dopamine



Methamphetamine stimulates the release of excess dopamine.

اثرات مصرف

↪ اثراتی مشابه آمفتامین داشته و فرد به شدت دچار افزایش حرکات بدنی خواهد گردید.

↪ ۲ الی ۳ دقیقه بعد از تزریق IV یا استفاده از سیگار حاوی کریستال حالت flashing ایجاد می گردد.

↪ **اثرات کوتاه مدت کریستال یخ:** افزایش هوشیاری و ادراک، عدم درک احساس خستگی، افزایش حرکات بدن، افوری، افزایش تعداد تنفس، احساس گرما، بیخوابی، بیقراری.

↪ **اثرات طولانی مدت کریستال یخ:** تخریب وسیع پایانه های سروتونین و دوپامین، افزایش ضربان قلب و افزایش فشارخون، تخریب مویرگ های مغز، حالت مشابه به پارکینسون، تشنج غیر قابل کنترل، مرگ.

کریستال بعلت حلایت بالا در الکل و آب به راحتی مورد سوء مصرف قرار می گیرد.

☒ عوارض جسمانی:

تخریب دندان و سفت شدن ماهیچه های فک ، خشکی شدید دهان، تهوع
استفراغ ، اسهال ، کاهش شدید وزن ، ایجاد تاول و خارش در دست، پا و
ناحیه شکم


☒ عوارض روانی:

اختلال در خواب ، افزایش هیجان و فعالیت ، تغییرات رفتاری (کج خلقی،
زود رنجی، آشفتگی ، عصبی شدن) ، پرخاشگری و تهاجم به اطرافیان
، پارانویا (جنون و سؤظن شدید و هذیان گویی)



تغییرات ناشی از مصرف کریستال



1998



2002



تغییرات دندان در یک معتاد به کریستال - یخ



تأثيرات ناشية از تزریق وریدی کریستال-یخ



نکات در رابطه با کریستال

- ۱- سریعتر از هر ماده ای می تواند ایجاد اعتیاد بکند.
- ۲- گزارشات زیادی از مرگ بعد از اولین مصرف مشاهده شده است.
- ۳- اگر فرد مصرف کریستال را متوقف کند دچار افسردگی عمیق می شود.
- ۴- به دنبال مصرف ممتد کریستال فرد دچار حالت های وحشت زدگی ،
عصبی شدن ، اضطراب پایدار ، بیخوابی شدید و انواع جنون می شود .
- ۶- مرگ

منابع

این مجموعه بیشترین مطالب خود را از این سایت ها گرفته است.

- <http://www.drugabuse.org.gov>
- <http://www.nid.nih.gov>
- <http://www.usdog.gov>
- <http://www.erowid.org>



آیامی توان تصور نمود که
مواد مخدر در مدت کوتاهی

'کاخچی' را به 'کوخی' تبدیل نماید .