



سایپر مستققات هر وین

Methadon



متادون

↔ سایر اسامی: Dolphamine, Adolophine

↔ ال - الفا - استیل متادون مشتقی طولانی اثر از متادون با نیمه عمر ۲ روز می باشد.

↔ اشکال موجود: قرص ۵، ۲۰، ۴۰ میلی گرم، شربت و آمپول ۱۰ میلی گرم در میلی لیتر می باشد.

↔ **نحوه مصرف:** خوراکی، تزریقی

↔ **اثرات:** اثری قوی تر از مرفین با نیمه عمر ۱۵-۲۵ ساعت می باشد بعنوان مسکن در درد های مزمن استفاده می گردد.

متادون جهت جلوگیری از بروز نشانه های قطع مصرف یا تقلیل نشانه ها بعنوان جانشین سایر مواد مخدر شبه تریاک، از راه خوراکی تجویز می گردد.

اثرات مصرف

افوری ، خواب الودگی ، تشنج ، سفتی عضلات ، میوز ،
تضعیف شدید تنفس ، ادم ریه ، تهوع ، استفراغ ، یبوست ،
کاهش عملکرد کلیه ، افزایش زمان زایمان ، تعریق ، ایجاد
خارش و برافروختگی پوست.



اعتیاد
زلزله زندگی

پیتیدین

⇐ نام های رایج : پیریدین

⇐ اشکال موجود : آمپول های ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم در میلی لیتر

⇐ نحوه مصرف : تزریقی

⇐ اثرات : اثرات این ماده ۱/۸ برابر مرفین می باشد. عوارض این ماده مانند مرفین می باشد.

⇐ ضد درد در مامایی و قبل از جراحی بعنوان داروی کمکی در بی هوشی کاربرد دارد.

نورجیزک

- ⇨ ماده مؤثره آمپول های نورجیزک بوپرونورفین است.
- ⇨ نورجیزک نام ماده تزریقی است که در ایران به طور غیر قانونی و به عناوین جعلی داروی ترک اعتیاد و بصورت ویال عرضه می گردد .
- ⇨ نوع دست ساز این آمپول ، غیر استریل و کشنده است.
- ⇨ ترکیبات شناخته شده نورجیزک عرضه شده در ایران شامل:
 - ۱- محلول هروئین (حلال های گوناگون از جمله متوکاربامول - ویتامین C - کلسیم گلوکونات و...)
 - ۲- کورتیکواستروئید (دگزامتازون)
 - ۳- یک آمفتامین

↔ از آنجایی که این فرآورده ها دست ساز بوده و براساس سلیقه و تجربه فردی ساخته می شود دارای عوارض متفاوتی خواهند بود.

↔ نورجیزک به شدت اعتیاد آور بوده و شکل توهم آن با توهم هروئین و توهم ناشی از مشتقات آمفتامین ها کاملا متفاوت است.

↔ اعتیاد از نوع روانی بسیار شدید بوده به گونه ای که در اکثر موارد به سرعت پس از یکی دو مرتبه استفاده به آن معتاد می شود.

عوارض :

اختلال سوخت و ساز بدن (کورتون موجود در آمپول)

سرکوب سیستم ایمنی

بعلت آلودگی های میکروبی باعث ایجاد آبسه های عفونی،

عفونت ریه، مغز و عفونت دریچه قلب در فرد مصرف کننده

می گردد.

Cushing syndrome

⇨ اولین عارضه ای که ویال های حاوی این ترکیبات از خود بروز می دهند سندرم کوشینگ می باشد.

⇨ فرد به دنبال مصرف این گونه داروها به شدت افزایش وزن و افزایش اشتها پیدا می کند.

⇨ وابستگی به این ویال ها خیلی سریع بوده و تolerانس نسبت به آن خیلی سریع روی می دهد و لذا مصرف فرد روزانه بیشتر شده و فرد به آن اعتیاد می یابد.

Cushing syndrome





منابع

این مجموعه بیشترین مطالب خود را از این سایت ها گرفته است.

- <http://www.drugabuse.org.gov>
- <http://www.nid.nih.gov>
- <http://www.usdog.gov>
- <http://www.erowid.org>



آیامی توان تصور نمود که
مواد مخدر در مدت کوتاهی

'گاخی' را به 'گوخی' تبدیل نماید .