

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

تَرْبِيَةٌ



Opium



تریاک



تریاک حاوی ۲۰ آلکالوئید مختلف می باشد که از جمله مهمترین آنها مرفین، کدئین، تبائین و پاپاورین می باشند.

◀ اشکال موجود :

تریاک ابتدا شیری رنگ بوده که در مقابل قهوه ای رنگ می شود ، سوخته تریاک (ماده قهوه ای برآق که با تدخین تریاک بدست می آید) ، شیره تریاک (ماده خمیری به رنگ قهوه ای روشن که از حرارت محلول حاوی سوخته تریاک بدست می آید) .

◀ نحوه مصرف:

خوراکی ، استنشاقی (تدخین) و تزریقی


اثرات مصرف

◀ **عوارض جسمانی** : خشکی دهان ، تهوع و استفراغ ، کاهش احساس درد ، احساس گرما ، خارش بینی ، کاهش فشار خون، میوز (مردمک ته سنجاقی)، اختلالات جنسی، وابستگی جسمی (اعتياد) .

◀ **عوارض روانی** : نئشگی (سرخوشی ، برطرف شدن خستگی ، کاهش غم و اندوه ، احساس شادابی) ، بی تفاوتی ، کج خلقی ، پرخاشگری ، بی قراری ، اختلال قضاوت.

عالائم ترک

- ◀ عوارض جسمانی : اسهال و دل پیچه ، استفراغ، درد عضلانی، آبریزش بینی و خمیازه.
- ◀ عوارض روانی : اضطراب ، بی قراری ، بی خوابی.



د رمان

قطع مصرف ماده مفدر

↳ علائم قطع مصرف مشتقات تریاک، معمولاً در خلال شش تا هشت ساعت بعد از آخرین مصرف ، در کسی که یک تا دو هفته بطور مداوم از این مواد مخدر استفاده نموده باشد ایجاد می گردد.

↳ شدت علائم در روز دوم و سوم بوده و معمولاً در عرض ۱۴-۱۰ روز عمدۀ علائم رفع می شود . استراحت کردن ، حمام داغ ، خوردن مایعات و غذای کافی به تحمل علائم ترک کمک می کند

علائم ترک : مردمک های گشاد ، سیخ شدن موهای بدن ، آبریزش از بینی و اشک ریزش ، عطسه ، خمیازه های طولانی ، تعريق ، تهوع و استفراغ ، اسهال ، درد در عضلات ، مفاصل و استخوانها ، بی قراری ، اضطراب، بی خوابی ، تحریک پذیری .

↳ کمک های روان - درمانی و مشاوره پس از ترک به تداوم ترک کمک می کند.

سم زدایی

⇒ سم زدایی با آگونیست الfa آدرنرژیک (کلونیدین): شروع درمان از مقدار ۲/۰ تا ۳/۰ میلی گرم در روزمی باشد.

این دارو باید طی ۲ الی ۴ هفته و به طور تدریجی قطع گردد. در سم زدایی داروهای نظیر ضد افسردگی های سه حلقه ای، NSAIDS ، بنزو دیازپین ، باکلوفن ، آنتی هیستامین و ... مصرف می گردد.

⇒ سم زدایی با آگونیست - آنتاگونیست : بوپرونورفین

متادون ټراپ

- ۱- مصرف به صورت خوراکی بوده و خطرات تزریق را ندارد.
- ۲- مصرف متادون یک کار قانونی و مجاز است.
- ۳- متادون سرخوشی کمی ایجاد می کند.
- ۴- متادون بندرت باعث ایجاد خواب آلودگی و یا افسردگی می شود.
- ۵- مهمتر از همه اینکه متادون به شخص اجازه می دهد تا به فعالیت های روزانه خود ادامه دهد و مرتكب کارهای خلاف برای بدست آوردن مواد مخدر نشود. تنها زیان متادون این است که شخص به یک ماده مخدر که همان متادون باشد ، معتاد است



درازد نگاه دارند

⇒ آنتاگونیست(نالترکسون) : مصرف داروی نالترکسون زمانی صورت می گیرد که اطمینان از سم زدایی کامل بیمار حاصل شده باشد در غیر اینصورت باعث ایجاد خطر مرگ برای مصرف کننده ماده مخدر خواهد شد.



آیامی ټوان ٿصور نہواد که

مواد مخدر در مدت گوتاهی

'کاخی' را بـ'کرۇخى' تېلەپل نهاید.