



## نکات دارویی پوساکونازول تزریقی

نام دارو	شکل دارویی	دوز دارو	شرایط نگهداری	نحوه آماده سازی	سرم سازگار برای تجویز و مدت زمان انفوزیون	پارامترهای مانیتورینگ	موارد منع مصرف	تداخلات مهم دارویی	نکات مهم
پوساکونازول	ویال حاوی ۳۰۰ میلی گرم در حجم ۱۶,۷ میلی لیتر	روز اول: ۳۰۰ میلی گرم دو بار در روز سپس ۳۰۰ میلی گرم روزانه	ویال اصلی: یخچال ویال باز شده: بلافاصله باید استفاده شود و قابل نگهداری نیست. فرآورده رقیق شده: تا ۲۴ ساعت در دمای یخچال قابل نگهداری است.	قبل از رقیق سازی باید به دمای اتاق برسد. هر ویال ۳۰۰ میلی گرم باید قبل از تزریق در ۱۵۰-۳۰۰ میلی لیتر از سرم های سازگار رقیق گردد. فرآورده بعد از رقیق سازی باید شفاف، بی رنگ تا زرد و عاری از هرگونه ذره باشد.	سرم N/S سرم H/S سرم D5W سرم D/S سرم 1/3,2/3 *فرآورده در سرم رینگر ناپایدار است. زمان انفوزیون هر ویال: ۹۰ دقیقه *تزریق فرآورده رقیق شده از طریق رگ مرکزی و با استفاده از ست های فیلتر دار ۲۲ صدم میکرون (PES یا PVDF) باید انجام گیرد. برای هر بار تزریق باید ست جداگانه استفاده گردد. *تنها دوز اول را می توان تا تعبیه لاین مرکزی از طریق رگ محیطی در مدت ۳۰ دقیقه انفوزیون کرد. طولانی شدن مدت زمان انفوزیون در این شرایط احتمال ترومبوفلیت را افزایش خواهد داد.	پایش عملکرد کبدی قبل از شروع و حین درمان پایش عملکرد کلیوی پایش الکترولیت های سرم قبل از شروع و حین درمان شمارش سلولهای خونی	تجویز همزمان با داروهای: سیرولیموس آلکالوئیدهای ارگوت آتورواستاتین کینیدین پیموزاید واکنش افزایش حساسیتی به هر کدام از داروهای دسته آزول ها	فرآورده مهارکننده قوی آنزیم های متابولیزه کننده در کبد می باشد لذا تجویز همزمان با برخی داروها، غلظت سرمی آنها را به میزان زیادی افزایش خواهد داد.	فرآورده irritant می باشد و تزریق آن باید از cv line صورت پذیرد. فرآورده حاوی سیکلودکسترین می باشد لذا در بیماران با $GFR < 30$ مزایای تزریق دارو در مقابل آسیب کلیوی باید توسط پزشک بررسی گردد. در بیماران دیالیزی با توجه به برداشت سیکلودکسترین توسط دیالیز قابل استفاده است.

تهیه و تنظیم: سازمان غذا و دارو - گروه خدمات بستری و سرپائی - دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت

از همکاران محترم تقاضا می شود در صورت مشاهده هرگونه اتفاق و عارضه های دارویی مراتب را از طریق پست الکترونیک [fdo\\_kashan@kaums.ac.ir](mailto:fdo_kashan@kaums.ac.ir) نامبر (۰۳۱-۵۵۴۷۳۹۲۹) یا تماس تلفنی (۰۳۱-۵۵۴۷۳۰۲۵) به مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم DPIC معاونت غذا و دارو کاشان ارائه نمایند.