



## تأثیر قطره متوکلوپرامید بر کودکان

یکی از مشکلات شایع دوران کودکی، ریفلاکس یا برگشت محتویات معده به مری است. ریفلاکس در کودکان علائم زیادی دارد که مهم‌ترین آنها شامل استفراغ، سرفه‌های مکرر، آروغ زدن‌های زیاد، کم‌خونی، بی‌قراری‌های شبانه و بی‌اشتهایی می‌شوند.

قطره متوکلوپرامید، یکی از داروهایی است که در درمان ریفلاکس کودکان تجویز می‌شود. استفاده از این دارو ممکن است سبب تغییرات فشار خون، افزایش ضربان قلب و بخصوص در کودکان و نوجوانان سبب عوارض اکستراپیرامیدال شود. همچنین بندرت می‌تواند سبب گیجی، خواب‌آلودگی، بی‌قراری و اسهال شود.

### متوکلوپرامید را در چه مواردی نباید مصرف کرد:

ابتلاء به صرع، خونریزی‌های گوارشی، انسداد روده و نارسایی شدید کبد و کلیه و همچنین در موارد حساسیت شدید به این دارو، از موارد منع مصرف متوکلوپرامید است. همچنین در دوران بارداری توصیه اکید می‌شود بدون تجویز پزشک از این دارو استفاده نشود. متوکلوپرامید در شیر مادر نیز ترشح می‌شود؛ اما به نظر می‌رسد در دوزهای کمتر از ۴۵ میلی‌گرم در روز، برای نوزاد بی‌خطر است.

### چه داروهایی را نباید با متوکلوپرامید مصرف کرد:

مسکن‌ها، داروهای ضدافسردگی، داروهای ضداضطراب، خواب‌آورها، آنتی‌هیستامین‌ها، داروهای ضد درد مخدر و لیتیوم را باید زیر نظر پزشک، با کنترل بیمار مصرف کرد.

### در مصرف قطره متوکلوپرامید برای کودکان به این نکات توجه کنید:

- ✓ این دارو جزء داروهای بدون نسخه نیست، بنابراین حتما با دستور پزشک باید استفاده شود.
- ✓ مقدار مصرف آن به صورت یک قطره به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، هر ۸ ساعت است.
- ✓ قطره را نیم ساعت قبل از غذا به کودک بدهید.
- ✓ چنانچه کودک حساسیت به صورت برفروختگی صورت و انحراف چشم‌ها داشت، باید از دادن قطره خودداری کرد.
- ✓ طبق گزارش انجمن طبی کودکان آمریکا به علت عوارض باید از مصرف قرص یا شربت پسدوافدرین یا آنتی‌هیستامین همراه با متوکلوپرامید خودداری کرد.