



اطلاعیه شماره: ۳

داکسی‌سایکلین فراتر از یک کپسول:

داکسی‌سایکلین یکی از آنتی‌بیوتیک‌های کارآمد است که امروزه برای درمان بسیاری از امراض کاربرد دارد؛ به طوری که هیچ جایگزینی را نمی‌توان برایش پیدا کرد. استفاده از این آنتی‌بیوتیک برای درمان جوش‌های غرور جوانی، عفونت‌های ادراری و تناسلی همچون سیفیلیس و سوزاک، سینه‌پهلوه‌های شدید، سینوزیت‌های حاد و عفونت‌های گوش تنها گوشه‌ای از کاربردهای این دارو محسوب می‌شوند.

متأسفانه یکی از مهم‌ترین علل خوددرمانی‌ها و طبیعتاً عوارض وخیم داکسی‌سایکلین از این واقعیت نشات می‌گیرد که بیمار پس از یک دوره مصرف آن و مشاهده اثرات درمانی خوب این دارو، دیگر به توصیه‌های پزشک در دفعات بعدی ابتلا توجه نمی‌کند و گمان می‌کند که می‌تواند خودسرانه باز هم مدتی اضافه از داکسی‌سایکلین استفاده کند. این در حالی است که در کنار اثرات درمانی منحصر به فرد داکسی‌سایکلین، این دارو از جمله پرعارضه‌ترین آنتی‌بیوتیک‌ها محسوب می‌شود به همین دلیل باید تنها به تشخیص پزشک معالج تجویز و مصرف شود.

این توصیه‌ها را جدی بگیرید

- بهتر است این دارو را با شکم پر و با آب فراوان میل کنید، چرا که مهم‌ترین عارضه داکسی‌سایکلین اثرات سوزانندگی مخاط است و اگر در داخل حفره دهان یا مری کپسولش باز شود، می‌تواند مخاط را بسوزاند و زخم‌های شدیدی را پدید آورد. و در حالت غیردرازکش خورده شود تا معده را ناراحت نکند.

- معمولاً این دارو در ۲ نوبت با فاصله ۱۲ ساعت یک بار مصرف می‌شود و باز هم به دلیل عوارض آن سعی شود که دوز مصرفی فراموش نشود و اگر بیش از ۴ ساعت از مصرف دوز مورد نظر، بیمار یادش بیفتد، بهتر است که دوز فراموش شده را حذف و دوز بعدی را سر ساعت مصرف کند. مقدار دارو را دو برابر نکنید.



- کسانی که داکسی‌سایکلین مصرف می‌کنند، مراقب باشند که زیاد زیر نور آفتاب نایستند، چرا که این دارو باعث ایجاد حساسیت نسبت به نور هم در چشم‌ها و هم در پوست می‌شود و باعث قرمزی ناشی از تابش نور در هر دو بافت می‌شود.
- هرگز از یاد نبرید تجویز داکسی‌سایکلین در کودکان زیر ۸ سال کاملاً ممنوع است.
- اگر داروهای ضد بارداری مصرف می‌کنید، هنگام مصرف داکسی‌سایکلین از روش دیگری نیز بهره ببرید چراکه داکسی‌سایکلین تا حدی اثرات داروهای ضد بارداری را کم می‌کند.
- اگر ظرف ۳ روز درمان با داکسی‌سایکلین احساس بهبودی نداشتید با پزشکان مشورت کنید.
- داکسی‌سایکلین را دور از دسترس کودکان، و دور از گرما، نور مستقیم یا رطوبت نگهداری کنید (داکسی‌سایکلین در این شرایط فاسد می‌شود).
- داکسی‌سایکلین تاریخ مصرف گذشته را دور بریزید. این دارو وقتی فاسد شود سمی می‌شود.
- هنگام مصرف داکسی‌سایکلین نباید شیر، محصولات لبنی، آنتی‌اسید، مکمل کلسیمی و مکمل آهن مصرف نمود.
- در دوران شیردهی از مصرف دارو خودداری نمایید.