



## خطاهای دارویی

### تحویل داروی اشتباه به بیمار

بیماری با سابقه بیماری قلبی پس از ملاقات پزشک خود برای دریافت داروهایش به داروخانه مراجعه می نماید. نسخه او حاوی پنج قلم داروی قلبی بود که در میان آنها قرص دی پیریدامول نیز وجود داشت که پزشک نام تجارتی آن را نوشته بود (Prezantin 75 mg tid N= 100). ناخوانا بودن خط پزشک و عدم توجه داروساز به بیماری و سایر داروهای بیمار باعث شد که داروخانه به جای قرص Prezantin 75 mg، قرص prednisolone 5mg به بیمار تحویل دهد و بیمار به مدت یک ماه روزانه ۳ عدد از آن را مصرف کند. پس از اتمام داروها، بیمار مجدداً به داروخانه مراجعه کرده و با نشان دادن نسخه قبلی، نسخه اش را تجدید کرده و به مصرف داروها ادامه می دهد.

در اثر مصرف مقادیر زیاد پردنیزولون بیمار دچار ادم شدید شده که در ساق پا شدید تر بوده است که بخاطر درمان آن به پزشک مراجعه می نماید. ایشان با این تشخیص که پای او چرک کرده است به سبک قدیم با سرنگ اقدام به خارج کردن چرکها می نماید. بیمار در اثر صدمات حاصله دچار مشکلات عروقی میگردد.

از مهمترین و شایع ترین علل زمینه ساز بروز خطا در دارو درمانی، عدم ارتباط صحیح بین پزشک، داروساز و بیمار است. در این میان ناخوانا بودن نسخه ها و شباهت نام داروها نقش مهمی دارند. در آمریکا سالانه ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ مرتبه از طرف داروخانه ها با پزشکان تماس گرفته می شود و در مورد داروهای ناخوانای نسخه سوال می کنند.

شباهت داروها از نظر نوشتاری یا گفتاری از مهمترین علل بروز اشتباهات دارویی است. به عنوان مثال شباهت نام برخی از داروها را در جدول زیر مشاهده می نمایید.

Allopurinol Haloperidol	Digestive digoxine	Pancreatine Pancronium	Periactin pancreatin
Chloramphenicol Chlorpheniramine	Nicardipine Nifedipine	Azithromycin Erythromycin	Salbutamol Sorbitol
Methocarbamol Metoclopramide	Hydrocodone Hydrocortison Hydroxyzine Hydralazin	Aricept Aciphex	Bcomplex Baclofen
Dopamine Dobutamine	Buspiron Bupropion	Alprazolam Alprostadił	Lasix Losar